



In de vorige KIDDO vermeldden we dat kinderen het recht hebben om helden te zijn. Maar zelfs de dapperste helden hebben wel eens een mindere dag, ze vallen of worden plots ziek. Als begeleid(st)er is het jouw beurt om dan redder in nood te zijn. Slaag jij voor deze EHBO-test? De antwoorden staan onderaan de pagina. Succes!

1. Mauro is drie maanden oud. Je merkt dat hij zich niet lekker voelt, zijn voorhoofd voelt koortsig. Je wilt zijn temperatuur meten. Hoe doe je dat?
 - a. Je brengt een oorthermometer in zijn oor.
 - b. Je brengt een digitale thermometer ongeveer 2 cm in zijn anus.
 - c. Je brengt een digitale thermometer ongeveer 2 cm onder zijn tong.
2. Baby Faye ademt niet meer. Terwijl je collega de hulpdiensten oproept, start jij de reanimatie. Hoe doe je dat?
 - a. Je geeft Faye twee beademingen. Je kijkt, luistert en voelt tien seconden of ze opnieuw begint te ademen, hoesten of bewegen. Is dit niet zo, dan geef je haar afwisselend vijftien hartmassages en twee beademingen. Je blijft dit doen tot de hulpdiensten het overnemen of een collega het overneemt omdat je zelf uitgeput bent.
 - b. Je geeft Faye twee beademingen. Je kijkt, luistert en voelt tien seconden of ze opnieuw begint te ademen, hoesten of bewegen. Is dit niet zo, dan geef je haar afwisselend dertig hartmassages en twee beademingen. Je blijft dit doen tot de hulpdiensten het overnemen of een collega het overneemt omdat je zelf uitgeput bent.
 - c. Je geeft Faye vijf beademingen. Je kijkt, luistert en voelt tien seconden of ze opnieuw begint te ademen, hoesten of bewegen. Is dit niet zo, dan geef je haar afwisselend dertig hartmassages en twee beademingen. Je blijft dit doen tot de hulpdiensten het overnemen of een collega het overneemt omdat je zelf uitgeput bent.
3. Abiba heeft ongemerkt de fles afwasmiddel vastgegrepen. Ze heeft er enkele flinke slokken van gedronken. Wat doe je?
 - a. Je neemt contact op met het Antigifcentrum (BE), huisarts of de GGD (NL) en deelt haar leeftijd, gewicht en de ingenomen hoeveelheid mee.
 - b. Je laat haar melk drinken. Je neemt contact op met het Antigifcentrum (BE), huisarts of de GGD (NL) en deelt haar leeftijd, gewicht en de ingenomen hoeveelheid mee.
 - c. Je steekt je vinger in Abiba's keel en laat haar braken. Je neemt contact op met het Antigifcentrum (BE), huisarts of de GGD (NL) en deelt haar leeftijd, gewicht en de ingenomen hoeveelheid mee.
4. Je stelt vast dat Stanley luizen heeft. Hoe reageer je hierop?
 - a. Je wast onmiddellijk het haar van alle aanwezige kinderen met antiluizenshampoo. Als de ouders hun kinderen komen halen, vraag je hun om deze behandeling de komende dagen thuis voort te zetten.
 - b. Je deelt het nieuws mee aan Stanley's ouders wanneer ze hem komen halen. Je vraagt hun de behandeling onmiddellijk te starten, met antiluizenshampoo of met de nat-kam-methode. Je informeert de andere ouders over de luizen, zonder de privacy van Stanley te schenden. Zo kunnen zij ook alert zijn op symptomen bij hun kind.
 - c. Je belt alle ouders op met de vraag om hun kinderen onmiddellijk te komen halen. Je sluit de opvang 48 uur en laat een gespecialiseerde firma alle lokalen desinfecteren. De ouders kunnen hun kind pas naar de heropende opvang brengen als ze een bewijs van behandeling kunnen voorleggen.

In de volgende KIDDO vind je deel 3: Hulp bieden aankinderen van 3 tot 12 jaar. •

De juiste antwoorden zijn 1) b, 2) c, 3) a en 4) b.